



**ЗАХИСТІТЬ ДИТИНУ
ВІД НЕВИЛІКОВНОГО
ПАРАЛІЧУ, СПРИЧИНЕНОГО
ПОЛІОМІЄЛІТОМ!**

поліоліміт

Захисти. Зупини.



Якщо у вашої дитини пропущене чи немає щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ), будь ласка, негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря!

Невакцинованим або не повністю вакцинованим дітям загрожує невиліковний параліч.

Як захистити дитину?

Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Для боротьби з поліомієлітом в Україні й в усьому світі використовують інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) та оральну поліомієлітну вакцину (ОПВ).

Вакцини, які використовують державні й приватні клініки, зареєстровані та дозволені для використання в Україні.

Де можна зробити щеплення?

В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік обов'язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна отримати безоплатно у вашого сімейного лікаря або педіатра*.

**Якщо лікар або педіатр працює у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров'я України.*

Як працюють вакцини від поліомієліту?


Інактивована
поліомієлітна
вакцина
містить вбитий вірус



Ін'єкції

Захищає від
паралічу

Від трьох штамів
I + II + III



Оральна
поліомієлітна
вакцина
містить ослаблений вірус



Краплі

Захищає від
хвороби і зупиняє
поширення
інфекції

тоПВ* I + II + III
моПВ** I або II, або III
боПВ*** I + III
ноПВ2**** II

*Тривалентна ОПВ **Моновалентна ОПВ ***Бівалентна ОПВ ****Моновалентна нОПВ2

Запобігає
потраплянню дикого
поліовірусу до
центральної нервової
системи, таким чином
захищаючи від паралічу

ЯК САМЕ ЗАХИЩАЄ

Формує імунітет у
кишківнику, отже,
захищає від зараження
і цим запобігає
поширенню вірусу.

2 дози ІПВ
(ін'єкції)

1 доза 2 місяці
2 доза 4 місяці

ЯК ВАКЦИНУЮТЬ ДІТЕЙ
ЗГІДНО З КАЛЕНДАРЕМ

+ 4 дози ОПВ
(краплі)


3 доза 6 місяців
4 доза 18 місяців
5 доза 6 років
6 доза 14 років

Поліомієліт повернувся в Україну

Кожна невакцинована або не повністю вакцинована дитина зараз у небезпеці.

В Україні критично низький рівень охоплення вакцинацією: лише 80%* дітей віком до одного року отримали три дози щеплення від поліомієліту за необхідних 95%.


**Дані МОЗ України станом на 1.01.2022.*



Поліовірус поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких симптомів у більшості інфікованих.

Що спричиняє поліомієліт?

Хворобу викликають поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через брудну воду.



Ліків від цієї хвороби не існує, єдиний захист — щеплення.

Якими можуть бути наслідки хвороби?

Поліомієліт може загрожувати величезній кількості невакцинованих або не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом кількох годин.

Серед тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, 5–10% помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м'язи.